

Durchführung öffentlich empfohlener Schutzimpfungen gemäß STIKO-Empfehlungen für Asylbewerber in EAE M-V

Stand: 08.10.2015

Abteilung Gesundheit

Seite 1 von 1

Ansprechpartner:
Dr. M. LittmannTelefonnummer:
0381-4955-312E-Mail Adresse:
Martina.littmann@lagus.mv-regierung.de

| Ankunftsalter | Empfohlene Impfung gegen (zunächst Beginn der Impfungen vor Ort; ggf. Weiterführung der erforderlichen Grundimmunisierungen lt. STIKO-Empfehlungen in den zuständigen Kommunen) |
|---|---|
| 0 – voll. 3. Lebensjahr | <p>Ab Beginn 3. Lebensmonat</p> <ul style="list-style-type: none"> - voll. 36. Lebensmonat (Infanrix Hexa®) / - voll. 24. Lebensmonat (Hexyon®): Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (IPV), Haemophilus influenzae b (Hib) Hepatitis B (HB) (6fach-Impfstoff) <p>Ab Beginn 10. Lebensmonat: Masern-Mumps-Röteln (MMR-Impfstoff) + ggf. Varizellen</p> |
| Ab Beginn 4. Lebensjahr - 17 Jahre | <p>Je nach Verfügbarkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis (Tdap-IPV) Repevax®: ab Beginn 4. Lebensjahr Boostrix Polio®: ab Beginn 5. Lebensjahr • Tetanus-Diphtherie-Pertussis (Tdap) Boostrix®: ab Beginn 5. Lebensjahr • Tetanus-Diphtherie-Poliomyelitis (Td-IPV) Revaxis®: ab Beginn 6. Lebensjahr <p>Masern-Mumps-Röteln (MMR) + ggf. Varizellen</p> |
| Erwachsene ab 18 Jahre | <p>Alle Erwachsene:</p> <p>Je nach Verfügbarkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis (Tdap-IPV) Repevax® Boostrix Polio®: • Tetanus-Diphtherie-Pertussis (Tdap) Boostrix® • Tetanus-Diphtherie-Poliomyelitis (Td-IPV) Revaxis® <p>Zusätzlich für nach 1970 Geborene: Masern-Mumps-Röteln (MMR)</p> |

Zusätzliche Indikationsimpfung INFLUENZA mit Vaxigrip® für:

- Schwangere ab 20. Schwangerschaftswoche
- Personen ab 60 Jahre
- Kinder (ab 6 Monate), Jugendliche und Erwachsene mit chronischen Krankheiten